

NajviÅje samoubistava u Banjaluci

28/03/2010 19:08 by Administrator

Od poÄetka 2007. do kraja proÅle godine u BiH se dogodilo Äak 1.539 samoubistava, a najviÅje ih je izvrÅjeno na podruÄju opÅtina Banjaluka, Bijeljina, Tuzla i Dobojs, pokazuju podaci entitetskih MUP-ova. Tako je za te tri godine na podruÄju ove Äetiri od 129 opÅtina koje je obuhvatilo istraÅivanje "Nezavisnih", izvrÅjeno Äak 248 samoubistava, Äto predstavlja 16 odsto od svih poÄinjenih samoubistava u BiH. Naime, na podruÄju opÅtine Banjaluka izvrÅjeno je 81, Bijeljina 58, Tuzla 57, a Dobojs 52 samoubistva. O koliko zastupljenoj problematici govorimo, dovoljno pokazuje podatak da su u RS za posljednjih osam godina poÄinjena 2.264 samoubistva, od Äega su u 25 sluÄajaeva suicid izvrÅili maloljetnici. Prema podacima FUP-a, samo proÅle godine na podruÄju FBiH sebi su Äiviot oduzela 234 lica.

NaÅalost, crni bilans nastavio se i ove godine, tako da je i u proteklih nekoliko sedmica izvrÅjen niz "dizanja ruke na sebe", ili su se pak, dogodili pokuÅaji istog. Jedan od posljednjih primjera dogodio se poÄetkom ovog mjeseca, kada se Zorka JokiÄ (75), srÄani bolesnik, bacila sa petog sprata KliniÄkog centra u Banjaluci, a nedugo zatim i podlegla zbog teÅkih povreda. SliÄan primjer dogodio se nedavno i u BihaÄtu, gdje je ÄetrdesetrogodiÅna Ismeta ÄtehiÄ, samohrana majka, sebi oduzela Äivot bacivÅi se u nabujalu rijeku Unu. TakoÄe, Dobojske je nedavno Äokirala vijest kada je SiniÅa DujkoviÄ (39), poznati Åahista iz tog grada, skokom kroz prozor iz svog stana pokuÅao da izvrÅi samoubistvo. Od straha do siromaÅtva: Prema podacima kojim raspolaÅe MUP RS, osnovni motivi samoubistava se svode na starost, strah od samoÅte i bolesti, nervno rastrojstvo, najÄeÅte u kombinaciji sa osiromaÅenjem, socijalnim statusom i socijalnom neizvjesnoÅtu, alkoholizmom, te osjeÄtajem besperspektivnosti uopÅte. "Za maloljetna lica koja se odluÄuju na ovakav korak karakteristiÄni motivi se svode na nerazumijevanje i sukobe sa roditeljima, nesreÄene odnose u porodici, neuspjeh u Åjcoli i sliÄno", rekla je Tijana SaviÄ, sluÅbenik za odnose s javnoÅtu u Kabinetu direktora Policije RS. Dok brojni parametri ukazuju da je depresija sveprisutna u druÅtvu, struÄnjaci upozoravaju da su razmiÅljanja o samoubistvu prisutna kod gotovo 80 odsto depresivnih osoba.

RazmiÅljanja kod depresivnih lica variraju od osjeÄtaja da je bolje da ih nema, do ozbiljnih razmiÅljanja o samoubistvu i pravljenja planova kako to izvrÅiti, pa sve do pokuÅaja ili izvrÅjenog samoubistva, kaÅu psihijatri. Marija BurgiÄ-RadmanoviÄ, naÄelnica Klinike za psihijatriju KliniÄkog centra Banjaluka, naglaÅjava da su suiciji posebno Äesti kod osoba koje boluju od depresije, bipolarnog afektivnog poremeÄtaja, shizofrenije i alkoholizma. "Takve osobe ili ne vide nikakvu dalju perspektivu u Äivotu, ili su pod uticajem psihopatoloÅkih zbivanja, poput halucinacija", pojasnila je BurgiÄ-RadmanoviÄ. Ova doktorica kaÅe da se suicidalno ponaÅjanje moÅe javiti iz sociopatoloÅkih razloga, kao Äto su ljubavni konflikti, konflikti u braku ili porodici, neuspjeh u Åjcoli, zbog teÅkih i hroniÄnih bolesti, invaliditeta. "Okolnosti koje mogu doprinijeti realizaciji suicidalnih misli su saznanje da se boluje od teÅke i neizljeÄive bolesti, bolesti koje stigmatizuju, slaba porodiÄna i socijalna podrÅika, finansijske poteÅkoÅte, promjene u socioekonomskom statusu, porodiÄno neslaganje, nasilje u porodici, stambeni problemi, problemi na poslu, neuspjeh u Åjcoli, i druge", nabrojala je BurgiÄ-RadmanoviÄ. Psiholozi kaÅu da je razumijevanje fenomena samoubistva veoma kompleksno pitanje, jer su faktori suicidalnog rizika brojni. Neki od faktora, po psiholozima, jesu pol, godine starosti, braÄni status, religijska pripadnost, urbana sredina, usamljenost, nezaposlenost, druÅtvene krize, razliÄiti porodiÄni problemi i razoÅarenja u Äivotu, odsustvo socijalne podrÅke i solidarnosti...

Faktori suicidalnog rizika koje psiholozi takoÄe Äesto navode su i gubitak meÄuljudske komunikacije, prethodni pokuÅaji suicida, suicid u porodici, naruÅavanje mentalnog zdravlja, depresivnost, koriÅtenje alkohola i droga, Äivotne promjene poput otkaza na poslu, odlazaka u penziju, odlazaka djece od kuÄte radi osamostaljenja, kao i razna organska oboljenja. NajÄeÅte ti faktori u svom djelovanju nisu usamljeni, odnosno viÅe njih djeluje istovremeno, navode psiholozi. PreÄtute suicidne ideje: Mr Sanja RadetiÄ-LovriÄ, psiholog, i viÅi asistent Filozofskog fakulteta u Banjaluci, kaÅe da da li Äte osoba pokuÅati ili izvrÅiti samoubistvo zavisi od toga koliko je njena psihijaka struktura spremna da odgovori na okolnosti njene socijalizacije. "Nerijetko se deÅava da signale koje nam Äjalju naÅi najmiliji ne prepoznajemo jer prosto ne moÅemo da povjerujemo u to da bi sebi zaista mogli oduzeti Äivot. S druge strane, osoba moÅe imati suicidalne ideje o kojima ne govori drugima, pa je utoliko teÅko znati za njih", istiÄe RadetiÄ-LovriÄ. JoÅi naglaÅjava da je osobi koja je u depresivnom stanju pogreÅno savjetovati "da se trgne", jer ona upravo nije u stanju to uÄiniti. Prema njenim rijeÄima, u takvim situacijama veoma je vaÅno

BLUSRCU.BA - Stranica za sve banjalucane sirom svijeta!

<http://blusrcu.ba>

BLUSRCU.BA - Stranica za sve banjalucane sirom svijeta!

<http://blusrcu.ba>

24 GraÄ•anica 24 Derventa 23 Ilijad 22 Pale 21 MrkonjiÄ‡ Grad
20 FoÄ•a

Izvor vijesti: Nezavisne